

Extractions des Dents de Sagesse

Conseils post-opératoires :

- **Ne Pas** fumer pour une période de 12hrs ou plus
- Pour une période de 48 heures :
 - **Ne pas** cracher, boire avec une paille, se rincer la bouche, manger épicé ou prendre un liquide chaud.
 - **Ne Pas** brosser la région de l'extraction.
 - Évitez l'exercice, de se pencher ou de forcer.
 - Mettre de la glace
- Garder les compresses et les changer aux 5 minutes jusqu'à ce que le saignement ait diminué (jusqu'à ce que le tampon soit blanc). Les dents du haut saignent plus longtemps.
- Prendre les médicaments pour la douleur tel que recommandé, cependant, si une réaction survient, SVP nous téléphoner à la clinique
- Ne rien manger de dur pendant 4 à 5 jours, prendre plutôt du liquide pour la 1^{ère} journée et pour les 2 à 5 jours suivants, prendre de la nourriture molle (crème glacée idéale).

Symptômes normaux suite à une extraction dentaire :

- Douleur pour 4 à 5 jours contrôlée par les médicaments
- Enflure pour 3 jours
- Saignement quelques heures

Complications possibles suite aux traitements - si vous éprouvez un des symptômes suivants, SVP nous téléphoner à la clinique :

- Fièvre
- Enflure durant plus de 3 jours
- Douleur durant plus de 5 jours
- Difficulté à ouvrir, à avaler ou à respirer
- Saignement prolongé de plus de 12 heures

Signature du patient (consentement) : _____

Risques associés avec l'extraction des dents de sagesse:

- Infection du site de l'extraction: une infection va causer de la douleur, de l'enflure et de fièvre. C'est facile à traiter avec des antibiotiques.
- Alvéolite: c'est une perte prématurée du caillot de sang. Les symptômes sont similaires à ceux d'une infection. On traite l'alvéolite par l'application d'un médicament au site de l'extraction.
- Irritation au niveau du nerf: irritation du nerf lingual et/ou alvéolaire inférieur due à la proximité de ceux-ci aux dents de sagesse inférieures. Cette irritation (très rare), peut causer une paresthésie (perte de sensation) de la lèvre inférieure et/ou de la langue. Cette perte de sensation, si elle survient, est temporaire (quelques jours ou quelques semaines) ou permanente. (très rare)
- Le bout de la racine de la dent peut briser à son extraction. Le dentiste peut laisser les morceaux en place sans problème si les enlever peut risquer de blesser les nerfs ou les structures environnantes.
- Dommages aux dents qui poussent proches des dents de sagesse pendant l'extraction.
- Communication entre la bouche et le sinus, si les dents supérieures sont trop proches du sinus. Se traite par fermeture de la communication orosinusale.

Signature du patient (consentement) : _____

Traitement Proposer:

Car _____

Consentement du patient:

Je comprend, les risque associés a la chirurgie. J'ai été informé des options de traitement si je ne procède pas aux extractions, et j'accepte le traitement. Mon dentiste a répondu a tout mes questions et préoccupations.

Nom du patient/tuteur : _____
Signature du patient/tuteur : _____
Nom du Dentiste : _____
Signature du Dentiste : _____
Nom du témoin : _____
Signature du témoin : _____
Date : _____